

RIVM speurt naar besmette vossen

maandag 06 september 2010 | 15:59 | Laatst bijgewerkt op: dinsdag 07 september 2010 | 12:07

NIJMEGEN - Het RIVM gaat in de grensstreek speuren naar vossen die mogelijk besmet zijn met de vossenlintworm.

Zowel mens als dier kan daar flink ziek van worden.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vraagt jagers die tussen oktober en maart in de grensstreek een vos schieten om het dode dier te laten onderzoeken.

Bij eerder onderzoek zijn in Limburg en Groningen besmette vossen gevonden. Mocht de vossenlintworm ook in Gelderland, Overijssel en Drente worden aangetroffen dan wordt het zaak om voorzorgsmaatregelen te treffen, zo stelt RIVM-onderzoeker Merel Langelaar.

Voor het onderzoek zijn er ongeveer driehonderd dode vossen nodig. De vossenlintworm is enkele millimeters lang en leeft in de darm van de vos. De eitjes van de lintworm, die met de ontlasting van de vos mee naar buiten komen, zijn besmettelijk. Mensen kunnen de eitjes eventueel binnenkrijgen door het eten van bosbessen of paddenstoelen, of door te tuinieren in bezoedelde grond.

"Vervolgens kunnen er in de lever blazen ontstaan die lijken op een kwaadaardige tumor en die steeds verder de lever ingroeien. De ziekte ontwikkelt zich langzaam. Het kan vijf tot tien jaar duren voordat je er ziek van wordt. De ziekte is vervelend en moeilijk behandelbaar. Al wordt ook niet iedereen er ziek van", aldus RIVM-onderzoeker Merel Langelaar.

zie verder [www.rivm.nl /cib/](http://www.rivm.nl/cib/)